

Gotas oftálmicas

Coltix
COLIRIO



DESCONGESTIVO OCULAR

Tetrahidrozolina

Cont. Neto 12 ml · Venta Libre · Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO. CONSERVE ESTE PROSPECTO YA QUE PUEDE TENER QUE VOLVER A LEERLO.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.

SI CONSIDERA QUE ALGUNO DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE SUFRE ES GRAVE O SI APARECE CUALQUIER EFECTO ADVERSO NO MENCIONADO EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO.

¿QUE CONTIENE COLTIX COLIRIO?

Cada 100 ml. contiene como ingrediente activo: Tetrahidrozolina, Clorhidrato 50 mg.

Ingredientes inactivos: Edta disódico, Cloruro de benzalconio, Borato de sodio decahidratado, Cloruro de sodio, Ácido bórico, Agua para inyección c.s.

ACCIÓN

Descongestivo ocular.

¿PARA QUE SE USA COLTIX COLIRIO?

Alivio temporario del disconfort y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX COLIRIO?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a la Tetrahidrozolina, a otras aminas simpaticomiméticas o a cualquiera de sus ingredientes, si padece de glaucoma (aumento de la presión ocular) o una infección microbiana ocular.

Tampoco está indicado en pacientes tratados con IMAO, niños, embarazadas y mujeres en período de lactancia.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su oftalmólogo para saber si padece alguna enfermedad ocular antes de utilizar este producto. La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento ocular.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento si:

- Tiene alguna enfermedad del corazón grave
- Tiene un tumor en las glándulas adrenales (Feocromocitoma)
- Tiene alguna enfermedad de tiroides (Hipertiroidismo)
- Tiene niveles de azúcar en sangre elevados (Diabetes Mellitus)
- Tiene la tensión arterial alta (Hipertensión)

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se deberá suspender la aplicación y consultar al oftalmólogo. Puede producir picazón o ardor ocular.

Si se presenta dolor ocular, cambios en la visión, incremento de la irritación o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Si usa lentes de contacto debe quitárselos antes de aplicar Coltix Colirio y colocrárselos algunos minutos después.

Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento: Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y colocar 1 gota por dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Mantener abierto el ojo tratado, sin parpadear, durante 30 segundos. Si fuese necesario, aplicar de igual forma la segunda gota. Luego parpadear normalmente. Seguir el mismo procedimiento si el otro ojo también estuviese irritado.

El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos. Después de cada aplicación cierre correctamente el envase. Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Posología y forma de administración:

Adultos: La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el ojo u ojos afectados, hasta 4 veces al día.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL?

LLAME POR TELÉFONO A UN CENTRO DE INTOXICACIONES O VAYA AL LUGAR MÁS CERCANO DE ASISTENCIA MÉDICA O COMUNÍQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS: **HOSPITAL A. POSADAS:** (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777 **HOSPITAL R. GUTIERREZ:** (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX COLIRIO?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0 800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE:

0800 333 1234

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 12 ml.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C).

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 57.496.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires. Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

Agosto 2014.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

 gramon millet