



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO. CONSERVE ESTE PROSPECTO YA QUE PUEDE TENER QUE VOLVER A LEERLO.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

SI LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O PERSISTEN DESPUÉS DE 72 HORAS DEBE CONSULTAR A UN MÉDICO.

SI CONSIDERA QUE ALGUNO DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE SUFRE ES GRAVE O SI APARECE CUALQUIER EFECTO NO DESEADO NO MENCIONADO EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO.

¿QUÉ CONTIENE COLTIX HIDRA?

Cada 100 ml contiene como ingrediente activo: Propilenglicol al 0,6%.

Ingredientes inactivos: Glicerina, Hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 400, Ácido bórico, Borato de sodio decahidrato, Polihexanida clorhidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio hexahidratado, Solución de lactato de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Povidona K30, Agua purificada c.s.

ACCIÓN

Lubricante.

¿PARA QUÉ SE USA COLTIX HIDRA?

Lea detenidamente esta información.

COLTIX HIDRA se usa para el alivio del ardor e irritación causados por la

LUBRICANTE OCULAR

Propilenglicol 0,6 %

COLIRIO

Cont. neto 12 ml - Venta libre - Industria Argentina

sequedad ocular (ojo seco) por su efecto humectante. Protege y disminuye los signos de irritación y alivia las molestias oculares ocasionadas por el viento, las altas temperaturas, el humo, el agua de piletas, el aire acondicionado y el uso de computadoras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX HIDRA?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

COLTIX HIDRA es para uso externo solamente, no debe ingerirse.

Consulte con el médico antes de aplicar el producto a los niños.

Si usted recibe o está utilizando algún otro medicamento o si está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO COLTIX HIDRA?

Si se presenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento y/o irritación del ojo u ojos, o bien si los síntomas persisten por más de 72 horas, suspender la aplicación y consultar con el médico.

No tocar ninguna superficie con la punta del envase ni compartir el producto para evitar su eventual contaminación.

Descartar luego de 30 días de abierto el envase. No aplicar si nota cambio de color u oscurecimiento en la solución. Mantenga el envase tapado luego de su uso.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

DOSIFICACIÓN

Adultos: colocar 1 o 2 gotas en el ojo u ojos afectados, 4 a 6 veces por día según la intensidad de la sintomatología.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL O SI UTILICÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

DIRÍJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INTOXICACIONES:

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 o (011) 4658-7777

HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 o (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX HIDRA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de **ANMAT RESPONDE:**

0800 333 1234

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 12 ml.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco (desde 15°C hasta 30°C).

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 57.613.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN

Enero 2015.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

DESCARTAR LUEGO DE 30 DÍAS DE ABIERTO EL ENVASE.

 **Gramon**

3163704844
GMT154 0723
228 / L618