



DOBLE ACCIÓN
DESCONGESTIVO Y LUBRICANTE OCULAR

Tetrahidrozolina · Povidona
Polietilenglicol 400 · Dextran 70

COLIRIO

Cont. neto 12 ml - Venta libre - Industria Argentina

¿QUÉ CONTIENE COLTIX ADVANCE?

Cada 100 ml contiene como ingredientes activos: Tetrahidrozolina clorhidrato 50 mg, Polietilenglicol 400 1 g, Povidona 1 g, Dextran 70 100 mg. Ingredientes inactivos: Edetato disódico, Ácido bórico, Borato de sodio, Polihexanida clorhidrato, Cloruro de sodio, Agua purificada.

ACCIÓN

Descongestivo y lubricante ocular.

¿PARA QUÉ SE USA COLTIX ADVANCE?

Lea detenidamente esta información.

COLTIX ADVANCE es un descongestivo y lubricante ocular para el alivio temporario del malestar y el enrojecimiento debido a irritaciones oculares leves.

Disminuye los signos de irritación ocular (ardor, picazón y enrojecimiento) provocados por el polvo, vientos fuertes, humo, contaminación ambiental, cloro de la pileta, exposición prolongada a pantallas de TV o computadoras u otros irritantes externos.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX ADVANCE?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes o a otros descongestivos oculares. No utilizar en niños, embarazadas y mujeres en período de lactancia. No emplear en pacientes con glaucoma o con infecciones microbianas oftálmicas. No utilizar en pacientes tratados con IMAO. Si usted está tomando o aplicándose otros medicamentos o ante cualquier duda consulte con su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usa lentes de contacto debe quitárselos antes de aplicar **COLIX ADVANCE** y puede volver a colocárselos 15 minutos

después. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si se presenta dolor a nivel ocular, cambios en la visión, incremento de la irritación o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

Puede producir picazón o ardor ocular. Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio.

En estos casos se deberá suspender el tratamiento. La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos puede aumentar el enrojecimiento ocular.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Para la correcta colocación de las gotas oftálmicas se sugiere inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás, separar los párpados, dirigir la mirada hacia arriba y colocar 1 o 2 gotas dentro del párpado inferior. Mantener los ojos abiertos durante algunos segundos y luego parpadear normalmente.

El orificio del frasco gotero no debe tocar con el ojo ni tocarse con los dedos. Cierre correctamente el frasco luego de cada aplicación.

Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Posología y forma de administración:

COLTIX ADVANCE está indicado solo en adultos. La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el ojo u ojos afectados, hasta 4 veces al día.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL O SI ME APLIQUÉ MAYOR CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental concurra al hospital más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología:

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 o (011) 4658-7777

HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 o (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX ADVANCE?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de **ANMAT RESPONDE:**

0800 333 1234

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 12 ml.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 57.644.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN

Abril 2015.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

 **Gramon**

3163702843
GMT182 0823
2357 L628