



ANTIALÉRGICO OCULAR
Ketotifeno 0,025%
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL
Cont. neto 5 ml - Venta libre - Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUÉ CONTIENE COLTIX ALERX?

Cada 100 ml contiene como ingrediente activo: Ketotifeno fumarato 34,50 mg (equivalente a 25 mg de Ketotifeno).

Ingredientes inactivos: Glicerina, Polihexanida clorhidrato (Sol 20%), Edetato disódico dihidrato, Hidróxido de sodio c.s.p., Agua purificada c.s.p.

ACCIÓN

Antialérgico ocular.

¿PARA QUÉ SE USA COLTIX ALERX?

Coltix Alerx se utiliza para el alivio de los síntomas de la alergia ocular, tales como, picazón e irritación de los ojos, lagrimeo e inflamación de los párpados.

El Ketotifeno es un antihistamínico que inhibe la liberación de histamina y la activación de las células involucradas en la respuesta alérgica.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX ALERX?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a algún componente de la formulación del producto.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de utilizar Coltix Alerx consulte a su oftalmólogo:

-Si Ud. padece alguna enfermedad ocular.

-Si Ud. recibe otro medicamento para el tratamiento de la depresión o alergia.

-No utilizar este medicamento en niños menores de 3 años de edad.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Interrumpa el uso de Coltix Alerx y consulte a su médico si presenta:

-Irritación, dolor o inflamación del ojo.

-Visión borrosa.

-Sequedad del ojo.

-Sensibilidad aumentada de los ojos a la luz.

-Hemorragia visible (sangrado) en la zona blanca del ojo.

-Dolor de cabeza.

-Somnolencia.

-Reacciones alérgicas de la piel, como eczemas (picazón, enrojecimiento, quemazón, hinchazón de la cara y/o párpados).

-Sequedad de la boca.

-Incremento de la severidad de una condición alérgica ya existente, como asma y eczema.

Coltix Alerx puede causar visión borrosa o somnolencia. No conduzca ni utilice máquinas hasta que hayan desaparecido estos efectos.

Si los síntomas oculares no mejoraran luego de 3 días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

Coltix Alerx puede aumentar los efectos del alcohol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

La equivalencia de la concentración es 0,25 mg de Ketotifeno /ml y 12,5 µg de Ketotifeno /gota.

Uso oftálmico solamente.

Si Ud. está utilizando otros colirios en forma simultánea, aguarde 15 minutos entre una aplicación y la otra.

Antes de la aplicación del producto lavarse las manos cuidadosamente.

Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento: con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y colocar 1 gota por dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Luego parpadear normalmente. Seguir el mismo procedimiento si el otro ojo también estuviese irritado.

Para evitar la contaminación del frasco gotero no debe tocar el ojo. Después de cada aplicación cierre correctamente el envase. Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Posología y forma de administración:

Adultos y niños mayores de 3 años: se recomienda 1 gota en cada ojo afectado, dos veces al día (mañana y tarde), cada 8 a 12 horas.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI EMPLÉÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

LLAME POR TELÉFONO A UN CENTRO DE INTOXICACIONES O VAYA AL

LUGAR MÁS CERCANO DE ASISTENCIA MÉDICA O COMUNÍQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS:

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 o (011) 4658-7777

HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 o (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX ALERX?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de **ANMAT RESPONDE:**

0800 333 1234

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 5 ml.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 25°C. Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 59.860.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

USO EXTERNO.

 Gramon

3163710840
GM1192 1023
236/L629